

Couleur / Colour/ Farbe / Farba/ Farve/ Боя/ Barva/ Χρώμα/ Litur/ Color/ Vär/ Boja/ Színező/ Colore/ Salpava/ Krása/ Farge/ Cor/ Vopsea/ Farba/ Kärg/ Kleur

Attention! Warning! Achtung! Uwaga! Bemerk! Внимание! Pozor! Athugið! Varúd! ¡Atención! Táhelepanu! Figeleme! Attenzione! Démesi! Uzmanıbu! Advarsel! Atençao! Atenje! Warning! Opgelet!Opgelet!



Contient/Contains/ Enthält/ Zawiera/ Inneholder/ Съдържа/ Obsahuje/ Περιέχει/ Inniheldur/ Contiene/ Sisaldb/ Sadrži/ Tartalmaz/ Contiene/ Sudétyje yra/ Satur/ Inneholder/ Contém/ Contine/ Obsahuje/ Sadří/ Vsebuje/ Innehåller/ Bevat:

ALCOOLS SECONDAIRES C11-15 ETHOXYLATE, PYRITHIONE DE ZINC, 2-MÉTHYL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONE/ SECONDARY ALCOHOLS C11-15 ETHOXYLATE, PYRITHIONE DE ZINC, 2-METHYL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONE/ DRUGERDÖWE ALKOHOL C11-15 ETOXSYLOWANE, PYRITIONIAN CYNUK, 2-METOLO-2H-ISOTIAZOL-3-ONE/ SEKUNDÄRE ALKOHOL C11-15 ETHOXYLATE PYRITHION AF ZINK, 2-METHYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE/ ВТОРИЧНИ АЛКОХОЛИ C11-15 ЕТОКСИЛАТ, ЦИНКОВ ПИРИТИОН, 2-МЕТХ-2H-ISOTIAZOLE-3-ONE/ СЕКУНДАРНИ АЛКОХОЛЫ C11-15 ЭТОХОЛАТ, ПИРИТИОН DE ZINC, 2-METHYL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONE/ АЛКОХОЛЫ SECUNDARIOS C11-15 ETOKSILADOS, PIRITIONA DE ZINC, 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE/ SEKUNDARNI ALKOHOLI C11-15 ETOKSILAT, CINKOV PIRITION, 2-METIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONE/ MÁSODLAGOS ALKOHOLAK C11-15 ETOKSILAT, CINKPIRITION, 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE/ ALCOLI SECUNDATORI C11-15 ETOKSILATI, PIRITIONE DI ZINCO, 2-METIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONE/ ANTRNIAL ALKOHOLIAI C11-15 ETOKSILATAS, CINKO PIRITIONAS, 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE/ SEKUNDÁRIE SPIRTE C11-15 ETOKSILÁTS, CINKA PIRITIONAS, 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE/ SEKUNDÄRE ALKOHOLER C11-15 ETOKSILAT, PYRITION ZINKU, 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE/ ALCOOLIS SECUNDÁRIOS C11-15 ETOKSILADOS, PIRITIONA DE ZINCO, 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE/ ALCOOLI SECUNDARI C11-15 ETOKSILAT, PIRITIONA DE ZINC, 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE/ SEKUNDÁRNIE ALKOHOLY C11-15 ETOXYLÁT, PYRITION ZINKU, 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE/ SEKUNDARNI ALKOHOLI C11-15 ETOKSILAT, CINKOV PIRITION, 2-METIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONE/ SEKUNDÁRNE ALKOHOLY C11-15 ETOXYLÁT, PYRITHION DE ZINC, 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE/ SECUNDÁIRE ALCOHOLEN C11-15 ETHOXYLAAT, ZINKPYRITION, 2-METHYL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONE

FR: Contient 2-MÉTHYL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONE. Peut produire une réaction allergique. Provoque une sévère irritation des yeux. Si un avis médical est requis, garder l'emballage ou l'étiquette d'identification à portée de main. Tenir hors de portée des enfants. Si l'irritation des yeux persiste : demander conseil à ou consulter un médecin. En cas d'inhalation ou contact avec la peau: En cas de manifestation allergique, consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux : rincer les yeux à l'eau courante pendant plusieurs minutes en écartant bien les paupières. Pour les douleurs, rougeurs ou troubles visuels, consultez un médecin. En cas d'ingestion : si de petites quantités ont été avalées (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin. Mettre au calme. Ne pas provoquer de vomissement. Consulter un médecin et lui montrer l'étiquette. En cas d'ingestion, appeler un médecin pour évaluer si une observation et un traitement stationnaire sont nécessaires. Montrer l'étiquette. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EN: Contains 2-MÉTHYL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONE. May produce an allergic reaction. Causes severe eye irritation. If medical advice is required, have packaging or label ready. Keep out of reach of children. If eye irritation persists: Seek medical advice/attention. In the event of exposure by inhalation or of splashes or contact with skin: In the event of an allergic reaction, seek medical attention. After eye contact: Rinse open eyes with running water for several minutes. In the case of discomfort, redness, or visual impairment, consult a doctor. After swallowing: If small amounts (not more than one sip) are ingested, rinse mouth with water and seek medical advice. Remain calm. Do not induce vomiting. Consult a doctor and show the label. If swallowed, notify a doctor to assess whether observation and in-patient follow-up are required. Show label. Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

DE/AUT: Enthält 2-MÉTHYL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Verursacht schwere Augenreizungen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in Hände von Kindern gelangen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/Ärztliche Hilfe hinzuholen. Nach Einatmen oder Hautkontakt: Bei Allergiezeichen einen Arzt konsultieren. Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalten mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen. Bei Beschwerden, Rötungen oder Sehbehinderung einen Arzt konsultieren. Nach Verschlucken: Bei Einnahme kleiner Mengen (nicht mehr als ein Schluck) Mund mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Ruhig stellen. Kein Erbrechen herbeiführen. Einen Arzt konsultieren und ihm das Etikett zeigen. Bei Verschlucken einen Arzt benachrichtigen, damit dieser beurteilt, ob eine Beobachtung und eine stationäre Nachbehandlung erforderlich sind. Etikett vorzeigen. Sehr giftig für Wassergarten mit langfristiger Wirkung.

PL: Zawiera 2-MÉTHYL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONE. Może powodować reakcję alergiczną. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Jeśli potrzebna jest porada medyczna, należy mieć pod ręką pojemnik lub etykietkę. Przeciwchowiąć w miejscu niedostępny dla dzieci. Przy utrzyciującym się podrażnieniu oczu: zasiegnąć porady / zgłosić się do lekarza. Po wyczuciu lub kontaktu ze skórą: W przypadku wystąpienia objawów alergii zasiegnąć porady lekarza. Po kontakcie z oczami: oczy przy otwartych powiekach przeklupiwać pod bieżącą wodą przez kilka minut. W przypadku dolegliwości, zaczewieniami lub zaburzeń widzenia skonsultować się z lekarzem. Zachować spokój. Nie wywoływać wymiotów. Zgłosić się do lekarza i pokazać mu etykietkę. W razie poikniecia powiadomić lekarza, aby mógł ocenić, czy konieczna jest obserwacja i dalsze leczenie szpitalne. Pokażać etykietkę. Działka bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

DK: Inneholder 2-MÉTHYL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONE. Kan föråsage allergiske reaktioner. Föråsager allvarlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring emballagen eller etiketten. Optøvares utilgængeligt for børn. Efter indåndning eller hudkontakt: Seg læge, hvis der opstår allergysymptomer. Ved vedvarende øjenirritation: Seg lægehjælp. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning. Seg læge og vis etiketten. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter, mens øjenhjælper holderes åben. Seg læge i tilfælde af smerte, redmen eller nedsat syn. Ved indtagelse af små mængder (ikke mere end en tå), skyld munden med vand og seg læge. Forhold dig i ro. Fremkald IK